

# Zum Schutz der BewohnerInnen vor der Covid-19-, Influenza- und RSV\*-Winterwelle

\*Respiratorisches Synzytial-Virus, Erreger einer Lungenentzündung

- Hygieneregeln einhalten
- Hohe Durchimpfungsraten bei BewohnerInnen und Personal anstreben
- Frühzeitige Medikamenteneinnahme bei Erkrankung sinnvoll

## Hygieneregeln

Tragen von Masken

Häufige Händedesinfektion

Abstand halten und Lüften

## Ziele der Impfungen

Reduktion von leichten Erkrankungen

Reduktion von schweren Erkrankungen mit Intensivaufenthalt und Todesfällen

Reduktion von Folgeeffekten (z.B. Post-Covid-Syndrom) auch nach leichteren Erkrankungen

## Impfempfehlungen

Impfungen gegen Covid-19 und Influenza können gleichzeitig verabreicht werden.

### Covid-19 Impfung

Allen Personen ab 12 Jahren jährlich empfohlen

Dem Gesundheitspersonal empfohlen

Besonders Personen mit Risikofaktoren und ab 60 Jahren empfohlen:

Aktuelle Auffrischung ehestmöglich frühestens vier Monaten nach dem letzten epidemiologischen Ereignis, unabhängig davon, wie viele Impfungen oder Covid-19 Infektionen man bereits zuvor hatte.

### Influenza Impfung

Allen Personen jährlich empfohlen

Dem Gesundheitspersonal empfohlen

Besonders für Personen mit Risikofaktoren und ab 60 Jahren empfohlen:

Hinweise: Ab 60 Jahre wird kostenpflichtig ebenso eine Impfung gegen RSV und eine sequenzielle Impfung gegen Pneumokokken empfohlen, um die Häufigkeiten von Lungenentzündung zu reduzieren.

Eine Information der Landesdirektion für Gesundheit

Informationen  
zu  
Covid-  
Medika-  
menten:

