



لسيدات والسادة الأعزاء!

نشكركم على اغتنام الفرصة لإجراء اختبار الحالة مجاناً كجزء من "اختبارات تيروول". من خلال القيام بذلك، فإنك تساهم بشكل كبير في إحتواء انتشار فيروس كورونا في تيروول. لأنه حتى إذا لم يشعر المصابون بأي أعراض، فيمكنهم نقل العدوى إلى الآخرين. مع "اختبارات تيروول"، يجب اكتشاف سلاسل العدوى والتغلب عليها في أقرب وقت ممكن.

يرجى الإنتباه إلى الملاحظة الهامة التالية: إذا كانت النقاط أدناه تنطبق عليك، فلا يمكن أخذ مسحة البلعوم الأنفي - من أجل سلامتك الشخصية:

- ضعف التنفس الأنفي (على سبيل المثال، إذا كنت لا تستطيع التنفس بحرية من خلال أنفك وفمك مغلق، كما في حالة الزكام، أو الحالة بعد الإصابات أو الجراحة الحديثة في هذه المنطقة، أو الزوائد اللحمية، أو إنحناء الحاجز الأنفي، إلخ)
- اضطراب تخثر الدم الخلفي أو المكتسب (إذا كنت مصاباً بإعتلال دموي أو تتناول أدوية مسيلة للدم، باستثناء دواء "ترومبو أس" (Thrombo-ASS))

يرجى ملاحظة ذلك قبل أخذ مسحة الاختبار:

- يرجى تنظيف الأنف من خلال إزالة المخاط بالمنديل.
- أنت تجلس أثناء أخذ المسحة. استريح خلال الإختبار.
- يتم إدخال عود المسحة مرة واحدة من خلال الأنف عبر الممر الأنفي السفلي إلى الجزء الخلفي من الحلق وتبقى هناك مع بضع لفات. تستغرق هذه العملية وقتاً قصيراً جداً وقد تكون غير مريحة وعادةً غير مؤلمة.
- قد تحدث الدموع و/أو السعال و/أو الإحساس بالتقيؤ. عادة ما تهدأ ردود الفعل هذه بسرعة كبيرة. في حالات نادرة، يمكن أيضاً الشعور بأحاسيس غير طبيعية لعدة ساعات. يمكن أن يحدث تهيج في الغشاء المخاطي للأنف مع ضعف بسيط في التنفس الأنفي.
- في حالات نادرة جداً، يمكن أن يحدث ألم وإصابات في الغشاء المخاطي للأنف مع نزيف في الأنف أو التهاب ثانوي. من أجل التوضيح الكامل، يجب الانتباه إلى احتمال إصابة سقف تجويف الأنف مع ضعف حاسة الشم أو الانهيار المرتبط بالألم
- إذا كان هناك أي مقاومة في الممر الأنفي، يتم إيقاف اللطخة.
- لا يتم أخذ مسحة الحلق البديلة لأنها غير صالحة.

إذا كانت لديك أسئلة إضافية، فيرجى الاتصال بأخصائي الرعاية الصحية.

أشكركم على مشاركتكم!