

# Informations médicales

## « Tests dans le Tyrol ».



Madame, Monsieur,

Un grand merci d'avoir saisi l'opportunité d'effectuer un test au coronavirus gratuit dans le cadre de « Tests dans le Tyrol ». Vous contribuez ainsi largement à endiguer la propagation du coronavirus dans le Tyrol. Car si certaines personnes ne présentent aucun symptôme, elles peuvent néanmoins contaminer d'autres individus. Avec « Tests dans le Tyrol », les chaînes d'infection sont détectées et rompues au plus vite.

**Veillez noter l'information importante suivante : si les points suivants vous concernent, un prélèvement nasopharyngé ne peut pas être effectué - pour votre propre sécurité :**

- Obstruction des voies nasales (par exemple, impossibilité de respirer par le nez avec la bouche fermée, comme dans le cas d'un rhume, de blessures, de polypes, de déformation de la cloison nasale ou à l'issue d'une opération chirurgicale récente dans cette zone, etc.)
- Trouble congénital ou acquis de la coagulation sanguine (en cas d'hémophilie ou de traitement anticoagulant, sauf Thrombo-ASS)

**Veillez noter les points suivants avant le test :**

- Veuillez vous moucher.
- Restez assis pendant le prélèvement. Détendez-vous.
- L'écouvillon est introduit une fois dans la voie nasale inférieure jusqu'à la paroi postérieure du pharynx, où il est tourné plusieurs fois pendant un court instant. Ce processus est très court, il peut être désagréable mais il est généralement indolore.
- Des larmes, de la toux ou une sensation d'étouffement peuvent survenir. En général, ces réactions se dissipent très rapidement. Dans de rares cas, des fourmillements peuvent néanmoins être ressentis pendant plusieurs heures. Il existe également un risque d'irritation de la muqueuse nasale associée à de légers troubles de la respiration nasale.
- Dans de très rares cas, des douleurs et des lésions de la muqueuse nasale peuvent se manifester par des saignements de nez ou une inflammation ultérieure. Par souci de transparence, il convient de signaler l'éventualité d'une lésion du plafond des fosses nasales associé à une perturbation de l'odorat ou d'un effondrement douloureux.
- Le prélèvement est interrompu en cas de résistance dans les voies nasales.
- Un prélèvement au niveau de la gorge n'est pas effectué en raison d'un manque de fiabilité.

Pour toutes questions complémentaires, veuillez vous adresser au personnel médical.

Un grand merci pour votre participation !