

Borkenflechte

Schmutz- oder Grindflechte, *Impetigo contagiosa*

Informationsblatt für die Eltern



Kurzinformation

Bei der ansteckenden Borkenflechte handelt es sich um eine sehr ansteckende eitrige Hauterkrankung.

Es besteht **keine** Meldepflicht.

Die Ansteckung erfolgt durch eine **Schmierinfektion** (direkter Kontakt mit infektiösem Material), die Inkubationszeit ist sehr variabel von 1 Tag bis zu mehreren Wochen.

Je nach Schwere der Infektion ist eine lokale oder systemische Antibiotikatherapie nötig.

Eine durch Streptokokken verursachte Impetigo wird mit einem entsprechenden Antibiotikum **10 Tage lang behandelt, damit das Risiko für das Auftreten einer Streptokokkennachkrankheit in Form einer Nierenerkrankung sinkt.**

24 Stunden nach Beginn einer wirkungsvollen antibiotischen Therapie ist bei der streptokokkenbedingten Impetigo der Besuch einer Gemeinschaftseinrichtung wieder möglich, sonst erst nach Abheilen aller Hauterscheinungen.

Übliche Hygieneempfehlungen können eine Weiterverbreitung weitgehend verhindern.

Von erkrankten Personen dürfen keine Mahlzeiten zubereitet werden.

Sorgfältige Hautpflege nach dem Abheilen verhindert eine rasche Wiederinfektion.