Hygienemaßnahmen in Gemeinschaftseinrichtungen

Allgemeine Maßnahmen



(Bildmaterial Shutterstock)

Was	Wann	Wie	Womit	Wer
Händereinigung	vor Dienstbeginn, bei Eintreffen in die Einrichtung, vor dem Essen, nach dem Toilettenbesuch, nach Verschmutzung, nach Tierkontakt	Händewaschen ⇒ 20 sec	Flüssigseife aus Spender, Trocknung mit Einmalpapiertuch	Alle
Händedesinfektion	nach Kontakt mit Stuhl, Blut, Erbrochenem oder anderem infektiösen Material, nach Ausziehen der Einmalhandschuhe, nach Kontakt mit Windeln	in die trockenen Hände einreiben (3 ml - min. 30 Sekunden)	Händedesinfektions- mittel (gebrauchsfertig und virusaktiv)	Erzieher/-innen Reinigungs- personal
Fußböden, Handkontaktflächen (Türklinken, Handläufe)	täglich und bei Verunreinigung	feucht wischen	Reinigungslösung	Reinigungs- personal Erzieher/-innen
Tische und andere waagerechte Flächen	täglich und bei Verunreinigung	feucht wischen	Reinigungslösung	Reinigungs- personal Erzieher/-innen
Reinigungstücher, Wischbezüge	täglich	Waschmaschine (60 ° C-Programm)	übliches Waschmittel	Reinigungs- personal
Spielzeug	1 x jährlich und bei Verunreinigung	feucht reinigen	Reinigerlösung	Reinigungs- personal Erzieher/-innen

Was	Wann	Wie	Womit	Wer
waschbare Spielutensilien	vierteljährlich und bei Verunreinigung	Waschmaschine (60 °C-Programm)	übliches Waschmittel	Reinigungs- personal Erzieher/-innen
Küchenzeile (Gruppenraum)	täglich	reinigen	Reinigerlösung	Reinigungs- personal
Geschirr, Besteck	nach Gebrauch	Geschirrspül- maschine, Langprogramm	üblicher Geschirrreiniger	Erzieher/-innen
Milchflaschen/ Schnuller	nach Gebrauch	vorreinigen und Geschirrspül- maschine, Langprogramm	mit Leitungswasser spülen , üblicher Geschirrreiniger	Erzieher/-innen
Waschbecken, WC-Becken, Toilettensitze, (Spültasten)	täglich und bei Verunreinigung	feucht wischen	Reinigungslösung	Reinigungs- personal Erzieher/-innen
Fußboden	täglich und bei Verunreinigung	feucht wischen	Reinigungslösung	Reinigungs- personal Erzieher/-innen
Seifenspender	täglich und bei Neufüllung	feucht wischen	Reinigungslösung	Reinigungs- personal Erzieher/-innen
Zahnputzbecher	wöchentlich	vorreinigen und Geschirrspül- maschine, Langprogramm	üblicher Geschirrreiniger	Erzieher/-innen
Zahnbürsten	nach Nutzung, Wechsel nach 8 Wochen bzw. bei Bedarf	spülen, Aufbewahrung mit Bürstenkopf nach oben	Wasser	Kinder Erzieher/-innen
Wickelauflage	Werden die Unterlagen nicht nach jedem Kind gewechselt od. werden keine Einmalunterlagen verwendet, muss der Wickeltisch nach jeder Benutzung mit einem Flächendesinfektionsmittel desinfiziert werden.	desinfizieren, wischreinigen	Desinfektionsmittellösung (virusaktiv)	Erzieher/-innen

Was	Wann	Wie	Womit	Wer
O ii valin navva a nav	na ah Cahnavah	facelet cois als an	Daining wall are s	Funish and in a su
Säuglingswaagen/- badewannen	nach Gebrauch	feucht wischen	Reinigungslösung	Erzieher/-innen
Töpfchen	nach Gebrauch	feucht reinigen/ desinfizieren, wischreinigen	Reinigungslösung nur bei personenbezo- genem Gebrauch; sonst Desinfektions- mittellösung(virusaktiv)	Erzieher/-innen
Schmutzwindel- behälter	täglich	Abfallbeutel entsorgen, feucht wischen	Reinigungslösung	Reinigungs- personal
Flächen aller Art	nach Verunreinigung mit Blut, Stuhl und Erbrochenem	Einmalhandschuhe verwenden! Verunreinigung mit desinfektionsmittelgetränktem Einmaltuch oder Zellstoff aufnehmen, mit Desinfektionsmittel nachwischen	Einmalhandschuhe, Einmalwischlappen/ Zellstoff Flächendesinfektions- mittel (virusaktiv)	Reinigungs- personal Erzieher/-innen
Waschbecken, WC-Becken, Toilettensitze, (Spültasten)	nach Verunreinigung mit Blut, Stuhl und Erbrochenem	Einmalhandschuhe verwenden! Verunreinigung mit desinfektionsmittelgetränktem Einmaltuch oder Zellstoff aufnehmen, mit Desinfektionsmittel nachwischen	Einmalhandschuhe Einmalwischlappen/ Zellstoff Flächendesinfektions- mittel (virusaktiv)	Reinigungs- personal Erzieher/-innen
Wickelauflage, Säuglingswaagen/- badewannen	nach Verunreinigungen mit Stuhl, Urin und Erbrochenem	Einmalhandschuhe verwenden! Verunreinigung mit desinfektionsmittelgetränktem Einmaltuch oder Zellstoff aufnehmen, mit Desinfektionsmittel nachwischen	Einmalhandschuhe Einmalwischlappen/ Zellstoff Flächendesinfektions- mittel (virusaktiv)	Reinigungs- personal Erzieher/-innen
Handkontaktflächen, WC-Becken, Toilettensitze, (Spültasten), Wickelauflage, Säuglingswaagen/-	bei bekannten gastrointestinalen Erkrankungen (Durchfall und Erbrechen) mit meldepflichtigen Erregern*	Einmalhandschuhe verwenden (!) und mit Desinfektions- mittel wischen	Einmalhandschuhe Einmalwischlappen/ Zellstoff Flächendesinfektions- mittel (virusaktiv)	Reinigungs- personal Erzieher/-innen
badewannen				

* Zu den meldepflichtigen Erregern gastrointestinaler Erkrankungen nach dem Epidemiegesetz 1950 gehören:

•	Noroviren	 Cholera
•	Rotaviren	 Polio
•	Salmonellen	 Typhus, Paratyphus
•	Shigellen	• Ruhr
•	E-coli (EHEC/VTEC)	Botulismus
•	Hepatitis A, Hepatitis E	Staphylokokkus aureus
•	Listerien	Yersinia

Durchführung der Desinfektion (immer Wischdesinfektion, nie Sprühdesinfektion – wegen Atemluftbelastung)

- Sichtbare Verschmutzungen (z. B. Ausscheidungen) sind vor der Desinfektion mit einem desinfektionsmittelgetränkten Einmaltuch oder Zellstoff zu entfernen (Handschuhe tragen).
- Die Fläche wird mit einem viruswirksamen Desinfektionsmittel in der vorgeschriebenen Konzentration behandelt. Einwirkzeit beachten!
- Eine Nachreinigung mit klarem Wasser nach der vorgeschriebenen Einwirkzeit kann erforderlich sein, wo es durch Kontakt mit der bloßen Haut zu Hautreizungen kommen kann (z. B. Auflagen für Wickeltische, Töpfchen). Hierbei sind die Empfehlungen des Herstellers zu beachten.
- Bei Desinfektionsarbeiten ist geeignete Schutzkleidung (Handschuhe, Schürze/Kittel) zu tragen.

Durchführung der Händedesinfektion

Campylobacter

- Grobe Verschmutzungen sind mit einem desinfektionsmittelgetränkten Einmaltuch oder Zellstoff zu entfernen.
- 3 5 ml des Präparates in die trockenen Hände einreiben, dabei Fingerkuppen, Fingerzwischenräume, Daumen und Nagelfalze besonders berücksichtigen.
- Während der vom Hersteller geforderten Einwirkzeit (meist 30 Sekunden) müssen die Hände vom Desinfektionsmittel feucht gehalten werden.

Quelle: Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit http://www.lgl.bayern.de/downloads/gesundheit/hygiene/

Stand: August 2025