



# Impfempfehlungen Österreich

	Erstes Lebensjahr	Kleinkindesalter	Schulalter bis 15 Jahre	erwerbstätiges Alter	älter als 60 Jahre
<b>Diphtherie, Wundstarrkrampf, Kinderlähmung Keuchhusten</b>	3x	nachholen	1x in der 3.Schulstufe	alle 10 Jahre auffrischen	alle 5 Jahre auffrischen
<b>Hepatitis B</b>	3x	nachholen	1x in der 7.-8. Schulstufe		
<b>HiB</b>	3x	nachholen			
<b>Pneumokokken</b>	3x	Kinder mit Risiken bis zum vollendeten 5.Lebensjahr			ab 60 Jahre 2x unterschiedliche Impfstoffe, bei Risikofaktoren alle 6 Jahre auffrischen
<b>Rotaviren</b>	3x				
<b>Meningokokken B</b>	2-3x	1x	nachholen bis vollendetes 25. LJ		
<b>Meningokokken C</b>		1x	nachholen bis vollendetes 10. LJ		
<b>Meningokokken ACW135Y</b>			1x in der 6.Schulstufe		
<b>Humane Papilloma Viren - HPV</b>			2x in der 5. Schulstufe oder zw. 9 und 12 Jahren	nachholen bis vollendetes 30. LJ	
			2 x zw. 12 und 15 Jahren; 3 x zw. 15 und 18 Jahren mit Selbstbehalt		
<b>Masern Mumps Röteln</b>	1x	1x	nachholen	nachholen	nachholen
<b>Influenza</b>	bei Erstimpfung ab dem 6.LM bis zum 8. (9.LJ) 2x , dann jährlich 1x Folgeimpfung				
<b>FSME („Zecken“)</b>		3x	Nach der Grundimmunisierung 1x nach 3 Jahren, dann alle 5 Jahre, ab dem 60. Lebensjahr alle 3 Jahre auffrischen		
<b>Varizellen (Schafblattern)</b>		2x			
<b>Hepatitis A</b>		2x			
<b>Herpes Zoster (Gürtelrose)</b>					ab 50 Jahre 2x

Hinweis: für die Covid-19 Impfung gibt es einen eigenen Impfplan