



Impfempfehlungen Österreich

	Erstes Lebensjahr	Kleinkindesalter	Schulalter bis 15 Jahre	erwerbstätiges Alter	älter als 60 Jahre
Diphtherie, Wundstarrkrampf, Kinderlähmung Keuchhusten	3x	nachholen	1x in der 3.Schulstufe	alle 10 Jahre auffrischen	alle 5 Jahre auffrischen
Hepatitis B	3x	nachholen	1x in der 7.-8. Schulstufe		
HiB	3x	nachholen			
Pneumokokken	3x	Kinder mit Risiken bis zum vollendeten 5.Lebensjahr		Risikopersonen: Ab 50 Jahre 2x im Jahresabstand, Auffrischen nach 6 Jahren empfohlen	Gesunde Erwachsene: Ab 60 Jahre 2x unterschiedliche Impfstoffe im Jahresabstand
Rotaviren	3x				
Meningokokken B	2-3x	1x	nachholen bis vollendetes 25. LJ		
Meningokokken C		1x	nachholen bis vollendetes 10. LJ		
Meningokokken ACW135Y			1x in der 6.Schulstufe		
Humane Papilloma Viren - HPV			2x in der 5. Schulstufe oder zw. 9 und 12 Jahren	nachholen bis vollendetes 30. LJ	
			Catch-up Impfung: 2x zw. 12 und 21 Jahren		
Masern Mumps Röteln	1x	1x	nachholen	nachholen	nachholen
Influenza	bei Erstimpfung ab dem 6.LM bis zum 8. (9.LJ) 2x , dann jährlich 1x Folgeimpfung				
FSME („Zecken“)		3x	Nach der Grundimmunisierung 1x nach 3 Jahren, dann alle 5 Jahre, ab dem 60. Lebensjahr alle 3 Jahre auffrischen		
Varizellen (Schafblattern)		2x			
Hepatitis A		2x			
Herpes Zoster (Gürtelrose)					ab 50 Jahre 2x

Hinweis: für die Covid-19 Impfung gibt es einen eigenen Impfplan

 Gratis im Säuglingsalter

 Gratis in der Schule durch Amtsärzt:innen

 Kostenpflichtig

 Gratis bei niedergelassenen Allgemeinmediziner:innen, Fachärzt:innen für Kinder- u. Jugendheilkunde, Fachärzt:innen für Frauenheilkunde und Geburtshilfe sofern sie an der Impfkation Tirol teilnehmen