



LAND
TIROL

Impfempfehlungen Österreich

	Erstes Lebensjahr	Kleinkindesalter	Schulalter bis 15 Jahre	erwerbstätiges Alter	älter als 60 Jahre
Respiratorische-Synzytial-Virus (RSV)	1x (bei Geburt)	1x vor der ersten RSV Saison für alle Kinder bis einem Jahr, für Risikokinder bis 2 Jahre	auf Wunsch in der Schwangerschaft in der 24. bis 36. SSW, vorzugsweise für Geburtstermine zwischen September und März, kostenpflichtig		1x ab 60, v. a. ab 75 empfohlen
Diphtherie, Wundstarrkrampf, Kinderlähmung Keuchhusten	3x	im 6. LJ eine weitere Auffrischimpfung vor Schuleintritt	1x in der 3. Schulstufe und weitere Auffrischimpfung in der 8. Schulstufe	alle 5 Jahre auffrischen (aber nur 2x mit der Kinderlähmungskomponente erforderlich)	alle 5 Jahre auffrischen (aber nur 2x mit der Kinderlähmungskomponente erforderlich)
Hepatitis B	3x	nachholen	1x in der 7.-8. Schulstufe		
HiB	3x	nachholen			
Pneumokokken	3x	Kinder mit Risiken bis zum vollendeten 5. Lebensjahr	Kinder mit Risiken alle 6 Jahre mit sequentieller Impfserie	Risikopersonen ab 18 Jahren: 1x Impfung mit neuem Impfstoff	Gesunde Erwachsene: 1x Impfung mit neuem Impfstoff, auch wenn zuvor bereits geimpft wurde.
Rotaviren	3x				
Meningokokken B	2x	1x	nachholen bis vollendetes 25. LJ		
Meningokokken ACW135Y		1x	1x in der 6. Schulstufe	nachholen bis vollendetes 25. LJ	
Humane Papilloma Viren - HPV			2x in der 5. Schulstufe oder zw. 9 und 12 Jahren	Ab 30 Jahre bei Indikation oder Wunsch kostenpflichtig	
			Catch-up Impfung: 2x zwischen 12 und 30 Jahren		
Masern Mumps Röteln	1x	1x	nachholen	nachholen	nachholen
Influenza	bei Erstimpfung ab dem 6. LM bis zum vollendeten 9. LJ 2x, dann jährlich 1x Folgeimpfung				
FSME („Zecken“)		3x	Nach der Grundimmunisierung 1x nach 3 Jahren, dann alle 5 Jahre, ab dem 60. Lebensjahr alle 3 Jahre auffrischen		
Varizellen (Schafblattern)		2x			
Hepatitis A		2x			
Herpes Zoster (Gürtelrose)				ab 18 Jahre bei Indikation	ab 60 Jahre oder bei Indikation
COVID-19	Bevorzugt bei erhöhtem Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf: z.B. Personen ab 60 Jahre, Schwangere, Personen mit Abwehrschwäche, stark übergewichtige Personen, besonders in Institutionen. Zudem Personal im Gesundheitswesen empfohlen. Von 6 Monaten bis 5 Jahre 3x, dann nur einmal jährlich, bevorzugt im Herbst				

 Gratis im Kinderimpfprogramm

 Gratis in der Schule durch AmtsärztInnen

 Kostenpflichtig

 Gratis bei niedergelassenen AllgemeinmedizinerInnen, FachärztInnen für Kinder- u. Jugendheilkunde, FachärztInnen für Frauenheilkunde, Geburtshilfe und öffentlichen Impfstellen sofern sie an der Impfkaktion Tirol teilnehmen