Zum Schutz der Bewohner:innen vor der Covid-19-, Influenza- und RSV*-Winterwelle

*Respiratorisches Synzytial-Virus, Erreger einer Lungenentzündung

- ☐ Hygieneregeln einhalten
- ☐ Hohe Durchimpfungsraten bei Bewohner:innen und Personal anstreben
- ☐ Frühzeitige spezielle Medikamenteneinnahme bei Erkrankung sinnvoll

Hygieneregeln

Tragen von Masken
Häufige Händedesinfektion
Abstand halten und Lüften

Ziele der Impfungen

Reduktion von leichten Erkrankungen
Reduktion von schweren Erkrankungen mit Intensivaufenthalt und Todesfällen
Reduktion von Folgeeffekten (z.B. Post- Covid-Syndrom) auch nach leichteren Erkrankungen

Impfempfehlungen

Impfungen gegen Covid-19 und Influenza können gleichzeitig verabreicht werden.

Covid-19 Impfung

Allen Personen ab 60 Jahren jährlich besonders empfohlen, ab 6 Monaten möglich

Dem Gesundheitspersonal empfohlen

Besonders Personen mit Risikofaktoren und ab 60 Jahren empfohlen

Aktuelle einmalige Auffrischung im Herbst frühestens vier Monaten (insbesondere bei Personen ab 60 Jahre) nach dem letzten epidemiologischen Ereignis, unabhängig davon, wie viele Impfungen oder Covid-19 Infektionen man bereits zuvor hatte.

Influenza Impfung

Allen Personen ab 6 Monaten jährlich empfohlen

Dem Gesundheitspersonal empfohlen

Besonders für Personen mit Risikofaktoren und ab 60 Jahren empfohlen

Hinweise: Ab 60 Jahre wird kostenpflichtig ebenso eine **Impfung gegen RSV** und eine **sequenzielle Impfung gegen Pneumokokken** empfohlen, um die Häufigkeiten von Lungenentzündung zu reduzieren.

Informationen zu Covid-Medika-menten:

Eine Information der Landesdirektion für Gesundheit