

Brutzeiten der Brutvögel Tirols

Im Sinne des TNSchG 2005 und der TNSchVO 2006 wären Störungen geschützter Vogelarten während der Brutsaison auf ein Minimum zu reduzieren. Die vorliegende Liste stellt eine Auswertung verfügbarer Literatur dar und gibt eine Übersicht der Fortpflanzungszeiten der in Tirol brütenden Vogelarten. Die Vogelbrutzeiten sollen als Orientierungshilfe dienen und Abweichungen z.B. bezogen auf unterschiedliche Höhenlagen können vorkommen. Die Brutzeiten (blau markiert) können zwischen den verschiedenen Arten stark variieren und der Beginn der Brutzeit wurde für jede Art eigens definiert (z.B. Balz, Nestbau, Revierbesetzung, usw.). Spätestens ab Beginn des Nestbaus und der Eiablage ("engere Brutzeit") können Störungen zu einer starken Beeinträchtigung des Brutgeschehens bzw. des Reproduktionserfolgs führen. Das Ende der Brutzeit wurde mit dem Erlangen der Flugfähigkeit der Jungvögel definiert. Bei mit * versehenem Datum handelt es sich um ungefähre Schätzungen, da keine spezifischen Literaturangaben vorhanden waren. Um die Relevanz für den Schutz einer Art abschätzen zu können, sind die Vogelarten in Gefährdungskategorien eingeteilt. Die aktuelle Rote Liste der Brutvögel Tirols stammt aus dem Jahr 2001 und gibt vor allem die Situation der 1990iger Jahre wieder. Seither hat sich die Datensituation stark verbessert, daher wurden jene Arten markiert, für die sich die Einstufung geändert haben könnte (** Gefährungsstatus evaluieren, Änderungen anzunehmen). Anhang I Arten der Vogelschutzrichtlinie sind rot hervorgehoben. Das Habitat und die Höhenstufe geben Auskunft über den bevorzugten Lebensraum einer Vogelart. Weitere Informationen zu den jeweiligen Vogelarten sind in den Kommentaren enthalten.

29. April, Samuel Sieder und Reinhard Lentner

| Artnamen (Deutsch) | Artnamen (Latein) | Beginn Brutzeit | Definition Beginn Brutzeit | Nestbau | Eiablage | Flügge | Gefährdungskategorie | Vogelschutzrichtlinie | Höhenstufe | Taxonomie (Familie) | Habitat | Kommentar |
|--------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------|------------------|-------------|--------------|-------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------------------|--|--|
| Alpenbraunelle | <i>Prunella collaris</i> | Mitte April | Ankunft am Brutplatz | Anfang Mai | Anfang Juni | Mitte August | 07 nicht gefährdet | | alpin | Braunellen (Prunellidae) | Gebirge | Nestbaubeginn in 1500 m nicht vor Mai, in 2500 m kaum vor Anfang Juni |
| Alpendohle | <i>Pyrrhocorax graculus</i> | Anfang April | Balz / Paarbildung | Mitte April | Anfang Mai | Ende Juli | 07 nicht gefährdet | | alpin | Rabenvögel (Corvidae) | Gebirge | |
| Alpenschnepf | <i>Lagopus muta</i> | Anfang April | Balz | Anfang Juni* | Anfang Juni | Mitte August | 07 nicht gefährdet** | Anhang I; Anhang II | alpin | Fasanenartige (Phasianidae) | Gebirge | Balzbeginn ab Anfang April; Legebeginn frühestens Ende Mai; Nest - einfache Bodenmulde |
| Alpensegler | <i>Tachymarptis melba</i> | Mitte April | Nestbau | Mitte April | Mitte Mai | Ende August | 06 Gefährdung anzunehmen** | | < 1600 m | Segler (Apodidae) | Fels | |
| Amsel | <i>Turdus merula</i> | Anfang März* | Nestbau | Anfang März* | Mitte März | Mitte August | 07 nicht gefährdet | Anhang II | < 1800 m | Drosseln (Turdidae) | Vielseitig | |
| Auerhahn | <i>Tetrao urogallus</i> | Mitte März | Balz | Anfang Mai* | Anfang Mai | Mitte August | 04 Gefährdet** | Anhang I; Anhang II | 1100 - 2200 m | Fasanenartige (Phasianidae) | Wald | Balzbeginn ab Ende März; Nest - einfache Bodenmulde |
| Bachstelze | <i>Motacilla alba</i> | Anfang April* | Nestbau | Anfang April* | Mitte April | Mitte August | 07 nicht gefährdet | | < 2200 m | Stelzen und Pieper (Motacillidae) | Gewässer | |
| Bartgeier | <i>Gypaetus barbatus</i> | Anfang November* | Nestbau | Anfang November* | Ende Januar | Mitte August | ka** | Anhang I | alpin | Habichtartige (Accipitridae) | Gebirge | Balz setzt im Januar ein |
| Baumfalke | <i>Falco subbuteo</i> | Anfang Mai | Revierbesetzung / Balzzeit | kein Nestbau | Anfang Juni | Ende August | 03 Stark gefährdet | | < 1200 m | Falkenartige (Falconidae) | Kulturland / Waldrand / halboffene Flächen | Besetzt alte Nester anderer Arten |
| Baumpieper | <i>Anthus trivialis</i> | Anfang April | Nestbau | Anfang April | Mitte April | Mitte August | 04 Gefährdet** | | < 2200 m | Stelzen und Pieper (Motacillidae) | Wald / Waldrand / halboffene Flächen | Habitat: auch im Gebirge |
| Bekassine | <i>Gallinago gallinago</i> | Ende März | Revierbesetzung / Balzzeit | Mitte April* | Mitte April | Mitte Juli | 02 Vom Verschwinden bedroht** | Anhang II | < 1000 m | Schnepfenvögel (Scolopacidae) | Feuchtgebiete | Nestmulde, wird ausgekleidet |

| Artnamen (Deutsch) | Artnamen (Latein) | Beginn Brutzeit | Definition Beginn Brutzeit | Nestbau | Eiablage | Flügge | Gefährdungskategorie | Vogelschutzrichtlinie | Höhenstufe | Taxonomie (Familie) | Habitat | Kommentar |
|--------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--|
| Berglaubsänger | <i>Phylloscopus bonelli</i> | Ende April | Ankunft am Brutplatz | Ende April | Anfang Mai | Mitte Juli | 07 nicht gefährdet | | < 2000 m | Laubsängerartige (Phylloscopidae) | Wald | |
| Bergpieper | <i>Anthus spinoletta</i> | Mitte April | Revierbesetzung | Anfang Mai | Anfang Mai | Mitte August | 07 nicht gefährdet | | alpin | Stelzen und Pieper (Motacillidae) | Gebirge | |
| Beutelmeise | <i>Remiz pendulinus</i> | Anfang April | Ankunft am Brutplatz | Anfang April | Anfang Mai | Mitte Juli | kA** | | < 700 m | Beutelmeisen (Remizidae) | Feuchtgebiete | halboffene Feuchtgebiete, bevorzugt in Auwäldern |
| Birkenzeisig | <i>Acanthis flammea</i> | Mitte April | Ankunft am Brutplatz | Mitte April* | Mitte Mai | Mitte August | 07 nicht gefährdet | | 1100 - 2200 m | Finken (Fringillidae) | Wald / Waldrand / halboffene Flächen | |
| Birkhuhn | <i>Lyrurus tetrix</i> | Ende März | Balz | Mitte Mai | Mitte Mai | Mitte Juli | 05 Nahezu gefährdet** | Anhang I; Anhang II | alpin | Fasanenartige (Phasianidae) | Wald / Waldrand / halboffene Flächen | Balzbeginn ab Anfang April; Nest - einfache Bodenmulde |
| Blässhuhn | <i>Fulica atra</i> | Anfang März | Nestbau | Anfang März | Anfang April | Mitte August | 03 Stark gefährdet** | Anhang II | < 1400 m | Rallen (Rallidae) | Gewässer | |
| Blaumeise | <i>Cyanistes caeruleus</i> | Mitte März | Balz | Ende März* | Anfang April | Ende Juli | 07 nicht gefährdet | | < 1200 m | Meisen (Paridae) | Vielseitig | |
| Bluthänfling | <i>Linaria cannabina</i> | Anfang April | Revierbesetzung | Anfang April* | Mitte April | Mitte August | 05 Nahezu gefährdet** | | < 2000 m | Finken (Fringillidae) | Wald / Waldrand / halboffene Flächen | |
| Braunkehlchen | <i>Saxicola rubetra</i> | Anfang Mai | Nestbau | Anfang Mai | Mitte Mai | Mitte August | 03 Stark gefährdet | | < 2000 m | Fliegenschnäpper (Muscicapidae) | Offene Flächen | Eiablage in der Subalpinstufe nicht vor Ende Mai/Anfang Juni, in tieferen Lagen ab Mitte Mai |
| Buchfink | <i>Fringilla coelebs</i> | Mitte März | Balz / Paarbildung | Mitte März | Mitte April | Ende Juli | 07 nicht gefährdet | | < 1800 m | Finken (Fringillidae) | Wald / Waldrand / halboffene Flächen | |
| Buntspecht | <i>Dendrocopos major</i> | Ende Februar | Revierbesetzung / Balzzeit | Ende März | Mitte April | Mitte Juli | 07 nicht gefährdet | | < 2000 m | Spechte (Picidae) | Wald | Zunahme der Balzintensität Ende März/Anfang April |

| Artname (Deutsch) | Artname (Latein) | Beginn Brutzeit | Definition Beginn Brutzeit | Nestbau | Eiablage | Flügge | Gefährdungskategorie | Vogelschutzrichtlinie | Höhenstufe | Taxonomie (Familie) | Habitat | Kommentar |
|-------------------|----------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|---------------|--------------|--|-----------------------|------------|-----------------------------------|--|--|
| Dohle | <i>Corvus monedula</i> | Anfang März | Nestbau | Anfang März | Mitte April | Mitte Juli | 02 Vom Verschwinden bedroht** | Anhang II | < 1200 m | Rabenvögel (Corvidae) | Vielseitig | |
| Dorngrasmücke | <i>Sylvia communis</i> | Mitte April* | Nestbau | Mitte April* | Anfang Mai | Mitte August | 02 Vom Verschwinden bedroht | | < 1600 m | Grasmückenartige (Sylviidae) | Kulturland / Waldrand / halboffene Flächen | bevorzugt in Auwäldern und Hecken |
| Dreizehenspecht | <i>Picoides tridactylus</i> | Ende Februar | Revierbesetzung / Balzzeit | Anfang April* | Mitte Mai | Mitte Juli | 08 Nicht genügend bekannt - Gefährdung möglich** | Anhang I | < 1600 m | Spechte (Picidae) | Wald | |
| Drosselrohrsänger | <i>Acrocephalus arundinaceus</i> | Ende April | Ankunft am Brutplatz | Anfang Mai* | Mitte Mai | Mitte August | 01 Verschwunden oder verschollen | | < 1000 m | Rohrsängerartige (Acrocephalidae) | Gewässer | |
| Eichelhäher | <i>Garrulus glandarius</i> | Ende März | Nestbau | Ende März | Mitte April | Ende Juni | 07 nicht gefährdet | Anhang II | < 2000 m | Rabenvögel (Corvidae) | Vielseitig | Habitat: Kulturland, Waldrand, Wälder, halboffene Flächen, Siedlungen |
| Eisvogel | <i>Alcedo atthis</i> | Anfang März* | Nestbau | Anfang März* | Anfang April | Mitte August | 02 Vom Verschwinden bedroht | Anhang I | < 1000 m | Eisvogel (Alcedinidae) | Gewässer | |
| Elster | <i>Pica pica</i> | Anfang März | Balz / Paarbildung | Anfang März | Anfang April | Ende Juli | 04 Gefährdet** | Anhang II | < 1800 m | Rabenvögel (Corvidae) | Vielseitig | |
| Erlenzeisig | <i>Spinus spinus</i> | Anfang Februar | Nestbau | Anfang Februar | Mitte Februar | Mitte Juli | 07 nicht gefährdet | | < 1800 m | Finken (Fringillidae) | Wald | |
| Feldlerche | <i>Alauda arvensis</i> | Mitte März | Balz / Paarbildung | Mitte April | Mitte April | Mitte August | 04 Gefährdet | Anhang II | < 2200 m | Lerchen (Alaudidae) | Offene Flächen | |
| Feldschwirl | <i>Locustella naevia</i> | Ende April | Nestbau | Ende April | Anfang Mai | Ende Juli | 02 Vom Verschwinden bedroht | | < 1000 m | Grassänger (Locustellidae) | Feuchtgebiete | Habitat: offene/halboffene Landschaften bzw. Feuchtgebiete, aber auch trockene Standorte |
| Feldsperling | <i>Passer montanus</i> | Mitte März | Nestbau | Mitte März | Mitte April | Mitte August | 07 nicht gefährdet | | < 700 m | Sperlinge (Passeridae) | Vielseitig | |

| Artname (Deutsch) | Artname (Latein) | Beginn Brutzeit | Definition Beginn Brutzeit | Nestbau | Eiablage | Flügge | Gefährdungskategorie | Vogelschutzrichtlinie | Höhenstufe | Taxonomie (Familie) | Habitat | Kommentar |
|----------------------|--------------------------------|-----------------|----------------------------|--------------|-------------|----------------|-------------------------------|-----------------------|------------|-----------------------------------|--|--|
| Felsenschwalbe | <i>Ptyonoprogne rupestris</i> | Mitte April | Balz / Paarbildung | Mitte April | Mitte Mai | Ende September | 07 nicht gefährdet** | | kA | Schwalben (Hirundinidae) | Fels | |
| Fichtenkreuzschnabel | <i>Loxia curvirostra</i> | Ganzjährig | kA | Ganzjährig | Ganzjährig | Ganzjährig | 07 nicht gefährdet | | < 2200 m | Finken (Fringillidae) | Wald | Hauptbrutperiode zwischen Dezember und Mai |
| Fitis | <i>Phylloscopus trochilus</i> | Anfang April | Nestbau | Anfang April | Mitte April | Mitte Juli | 04 Gefährdet** | | < 1600 m | Laubsängerartige (Phylloscopidae) | Wald | |
| Flussregenpfeifer | <i>Charadrius dubius</i> | Mitte April | Eiablage | kein Nestbau | Mitte April | Mitte Juli | 02 Vom Verschwinden bedroht** | | < 1000 m | Regenpfeifer (Charadriidae) | Gewässer | Nestmulde, kein Nestbau |
| Flussuferläufer | <i>Actitis hypoleucos</i> | Mitte April | Nestbau | Mitte April | Mitte April | Mitte Juli | 04 Gefährdet | | < 1800 m | Schnepfenvogel (Scolopacidae) | Gewässer | Nestmulde, wird ausgekleidet |
| Gänsesäger | <i>Mergus merganser</i> | Mitte März | Eiablage | kein Nestbau | Mitte März | Mitte August | 03 Stark gefährdet | Anhang II | kA | Entenvogel (Anatidae) | Gewässer | Höhlenbrüter |
| Gartenbaumläufer | <i>Certhia brachydactyla</i> | Anfang März | Nestbau | Anfang März | Mitte März | Mitte August | 03 Stark gefährdet | | < 1000 m | Baumläufer (Certhiidae) | Wald / Waldrand / halboffene Flächen | bevorzugt in Auwäldern |
| Gartengrasmücke | <i>Sylvia borin</i> | Mitte April* | Nestbau | Mitte April* | Anfang Mai | Mitte August | 07 nicht gefährdet** | | < 2000 m | Grasmückenartige (Sylviidae) | Vielseitig | |
| Gartenrotschwanz | <i>Phoenicurus phoenicurus</i> | Anfang April | Nestbau | Anfang April | Anfang Mai | Mitte Juli | 05 Nahezu gefährdet** | | < 1800 m | Fliegenschnäpper (Muscicapidae) | Kulturland / Waldrand / halboffene Flächen | |
| Gebirgsstelze | <i>Motacilla cinerea</i> | Anfang März* | Nestbau | Anfang März* | Mitte März | Ende August | 07 nicht gefährdet | | < 2000 m | Stelzen und Pieper (Motacillidae) | Gewässer | |
| Gelbspötter | <i>Hippolais icterina</i> | Anfang Mai | Ankunft am Brutplatz | Anfang Mai* | Mitte Mai | Mitte August | 03 Stark gefährdet** | | < 1600 m | Rohrsängerartige (Acrocephalidae) | Kulturland / Waldrand / halboffene Flächen | bevorzugt in Auwäldern |

| Artnamen (Deutsch) | Artnamen (Latein) | Beginn Brutzeit | Definition Beginn Brutzeit | Nestbau | Eiablage | Flüge | Gefährdungskategorie | Vogelschutzrichtlinie | Höhenstufe | Taxonomie (Familie) | Habitat | Kommentar |
|--------------------|----------------------------|-----------------|----------------------------|---------------|----------------|------------------|--------------------------------|-----------------------|------------|---------------------------------|--------------------------------------|---|
| Gimpel | <i>Pyrrhula pyrrhula</i> | Anfang März | Revierbesetzung | Anfang April | Mitte April | Mitte August | 07 nicht gefährdet | | < 2000 m | Finken (Fringillidae) | Wald / Waldrand / halboffene Flächen | |
| Girlitz | <i>Serinus serinus</i> | Ende März | Revierbesetzung | Mitte April | Mitte April | Mitte August | 07 nicht gefährdet** | | < 1400 m | Finken (Fringillidae) | Vielseitig | |
| Goldammer | <i>Emberiza citrinella</i> | Anfang April* | Nestbau | Anfang April* | Mitte April | Anfang September | 07 nicht gefährdet | | < 1200 m | Ammern (Emberizidae) | Offene Flächen | |
| Graumammer | <i>Emberiza calandra</i> | Anfang April | Balz / Paarbildung | Ende April* | Mitte Mai | Mitte August | 02 Vom Verschwinden bedroht** | | < 1000 m | Ammern (Emberizidae) | Offene Flächen | |
| Graugans | <i>Anser anser</i> | Anfang März* | Nestbau | Anfang März* | Mitte März | Ende Mai | kA** | Anhang II | kA | Entenvögel (Anatidae) | Gewässer | |
| Graureiher | <i>Ardea cinerea</i> | Ende Januar* | Nestbau | Ende Januar* | Anfang Februar | Ende August | 02 Vom Verschwinden bedroht ** | | < 1200 m | Reiher (Ardeidae) | Gewässer | |
| Grauschnäpper | <i>Muscicapa striata</i> | Anfang Mai | Ankunft am Brutplatz | Anfang Mai | Mitte Mai | Mitte August | 07 nicht gefährdet | | < 1600 m | Fliegenschnäpper (Muscicapidae) | Vielseitig | |
| Grauspecht | <i>Picus canus</i> | Ende Februar | Revierbesetzung / Balzzeit | Mitte März | Mitte April | Ende Juli | 04 Gefährdet** | Anhang I | < 1800 m | Spechte (Picidae) | Wald / Waldrand / halboffene Flächen | Bau der Höhle mitunter schon im Februar, häufiger ab Ende März; Habitat: in lichten Wäldern (Misch-, Nadel-, Laub- oder Auwälder) |
| Grünfink | <i>Chloris chloris</i> | Ende März | Revierbesetzung | Mitte März | Anfang April | Mitte August | 07 nicht gefährdet | | < 1600 m | Finken (Fringillidae) | Vielseitig | |
| Grünspecht | <i>Picus viridis</i> | Ende Februar | Revierbesetzung / Balzzeit | Mitte März | Mitte April | Mitte Juli | 05 Nahezu gefährdet** | | < 2000 m | Spechte (Picidae) | Wald / Waldrand / halboffene Flächen | Eigentliche Höhlenbau ab Anfang März, meist Ende März/Anfang April |
| Habicht | <i>Accipiter gentilis</i> | Anfang März | Nestbau | Anfang März | Anfang April | Mitte Juli | 06 Gefährdung anzunehmen** | | kA | Habichtartige (Accipitridae) | Wald | |

| Artnamen (Deutsch) | Artnamen (Latein) | Beginn Brutzeit | Definition Beginn Brutzeit | Nestbau | Eiablage | Flügge | Gefährdungskategorie | Vogelschutzrichtlinie | Höhenstufe | Taxonomie (Familie) | Habitat | Kommentar |
|--------------------|------------------------------|-----------------|----------------------------|---------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------|------------|---------------------------------|-----------------------|--|
| Haselhuhn | <i>Bonasa bonasia</i> | Mitte März | Balz | Mitte April* | Mitte April | Mitte Juli | 06 Gefährdung anzunehmen** | Anhang I; Anhang II | < 2200 m | Fasanenartige (Phasianidae) | Wald | Balzbeginn ab Mitte März; Nest - einfache Bodenmulde |
| Haubenmeise | <i>Lophophanes cristatus</i> | Mitte März | Balz / Paarbildung | Ende März* | Anfang April | Mitte Juli | 07 nicht gefährdet | | < 2000 m | Meisen (Paridae) | Wald | |
| Haubentaucher | <i>Podiceps cristatus</i> | Ende März* | Nestbau | Ende März* | Anfang April | Ende August | 02 Vom Verschwinden bedroht ** | | < 1000 m | Lappentaucher (Podicipedidae) | Gewässer | |
| Hausrotschwanz | <i>Phoenicurus ochruros</i> | Anfang April* | Nestbau | Anfang April* | Mitte April | Mitte August | 07 nicht gefährdet | | < 2500 m | Fliegenschnäpper (Muscicapidae) | Vielseitig | |
| Haussperling | <i>Passer domesticus</i> | Mitte März | Nestbau | Mitte März | Mitte April | Mitte September | 07 nicht gefährdet | | < 2200 m | Sperlinge (Passeridae) | Siedlung / Kulturland | |
| Heckenbraunelle | <i>Prunella modularis</i> | Anfang April* | Nestbau | Anfang April* | Mitte April | Mitte August | 07 nicht gefährdet | | < 2200 m | Braunellen (Prunellidae) | Vielseitig | |
| Höckerschwan | <i>Cygnus olor</i> | Anfang März | Nestbau | Anfang März | Mitte März | Ende Juni | 02 Vom Verschwinden bedroht** | Anhang II | kA | Entenvögel (Anatidae) | Gewässer | |
| Hohltaube | <i>Columba oenas</i> | Mitte Februar | Revierbesetzung | Anfang März* | Mitte März | Mitte September | 02 Vom Verschwinden bedroht ** | Anhang II | < 1600 m | Tauben (Columbidae) | Vielseitig | |
| Italiensperling | <i>Passer italiae</i> | Mitte April | Eiablage | kA | Mitte April | Mitte September | 06 Gefährdung anzunehmen** | | < 2200 m | Sperlinge (Passeridae) | Siedlung / Kulturland | |
| Kanadagans | <i>Branta canadensis</i> | Mitte März | Eiablage | kA | Mitte März | kA | kA | | kA | Entenvögel (Anatidae) | Gewässer | |
| Karmingimpel | <i>Carpodacus erythrinus</i> | Mitte Mai | Nestbau / Eiablage | Mitte Mai | Mitte Mai | Mitte Juli | 03 Stark gefährdet** | | < 2000 m | Finken (Fringillidae) | Vielseitig | |

| Artname (Deutsch) | Artname (Latein) | Beginn Brutzeit | Definition Beginn Brutzeit | Nestbau | Eiablage | Flügge | Gefährdungskategorie | Vogelschutzrichtlinie | Höhenstufe | Taxonomie (Familie) | Habitat | Kommentar |
|-------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------------------------|-----------------------|------------|------------------------------|--|---|
| Kernbeißer | <i>Coccothraustes coccothraustes</i> | Ende März | Nestbau | Ende März | Mitte April | Mitte Juli | 04 Gefährdet | | < 1400 m | Finken (Fringillidae) | Wald / Waldrand / halboffene Flächen | |
| Klappergrasmücke | <i>Sylvia curruca</i> | Ende April | Ankunft am Brutplatz | Anfang Mai* | Mitte Mai | Mitte August | 07 nicht gefährdet | | < 2200 m | Grasmückenartige (Sylviidae) | Vielseitig | |
| Kleiber | <i>Sitta europaea</i> | Anfang März | Nestbau | Anfang März | Anfang April | Ende Juli | 07 nicht gefährdet | | < 1600 m | Kleiber (Sittidae) | Wald / Waldrand / halboffene Flächen | |
| Kleinspecht | <i>Dryobates minor</i> | Ende Februar | Revierbesetzung / Balzzeit | Anfang April | Mitte April | Mitte Juni | 02 Vom Verschwinden bedroht ** | | < 1200 m | Spechte (Picidae) | Wald | Paarbildung im Februar |
| Kohlmeise | <i>Parus major</i> | Anfang März* | Nestbau | Anfang März* | Mitte März | Mitte August | 07 nicht gefährdet | | < 1800 m | Meisen (Paridae) | Vielseitig | |
| Kolkrabe | <i>Corvus corax</i> | Anfang Februar | Nestbau | Anfang Februar | Mitte Februar | Mitte Juni | 07 nicht gefährdet | | < 2500 m | Rabenvögel (Corvidae) | Vielseitig | bevorzugt an Felsen |
| Krickente | <i>Anas crecca</i> | Mitte April | Nestbau | Mitte April | Mitte April | Mitte Juli | 02 Vom Verschwinden bedroht | Anhang II | < 1200 m | Entenvögel (Anatidae) | Gewässer | |
| Kuckuck | <i>Cuculus canorus</i> | Mitte April | Eiablage | kein Nestbau | Anfang Mai | Mitte Juli | 05 Nahezu gefährdet** | | < 2500 m | Kuckucke (Cuculidae) | Vielseitig | |
| Mauerläufer | <i>Tichodroma muraria</i> | Anfang April | Ankunft am Brutplatz | Anfang Mai | Mitte Mai | Ende Juli | 07 nicht gefährdet** | | < 2500 m | Tichodromidae | Fels | |
| Mauersegler | <i>Apus apus</i> | Mitte April* | Nestbau | Mitte April* | Anfang Mai | Mitte August | 05 Nahezu gefährdet** | | < 1000 m | Segler (Apodidae) | Siedlung / Kulturland | |
| Mäusebussard | <i>Buteo buteo</i> | Mitte Februar | Nestbau | Mitte Februar | Mitte März | Mitte August | 07 nicht gefährdet | | kA | Habichtartige (Accipitridae) | Kulturland / Waldrand / halboffene Flächen | Ab zweiter Februarhälfte mit Nestbau zu rechnen, Neuerstellung eines Horstes dauert ca. 1 Monat |

| Artnamen (Deutsch) | Artnamen (Latein) | Beginn Brutzeit | Definition Beginn Brutzeit | Nestbau | Eiablage | Flügge | Gefährdungskategorie | Vogelschutzrichtlinie | Höhenstufe | Taxonomie (Familie) | Habitat | Kommentar |
|-----------------------|------------------------------|-----------------|----------------------------|---------------|-------------|-----------------|--|-----------------------|------------|---------------------------------|--------------------------------------|---|
| Mehlschwalbe | <i>Delichon urbicum</i> | Mitte April | Balz / Paarbildung | Ende April* | Mitte Mai | Ende September | 05 Nahezu gefährdet** | | < 2500 m | Schwalben (Hirundinidae) | Siedlung / Kulturland | |
| Misteldrossel | <i>Turdus viscivorus</i> | Mitte März | Nestbau / Eiablage | Mitte März | Mitte März | Ende Juli | 07 nicht gefährdet | Anhang II | kA | Drosseln (Turdidae) | Wald / Waldrand / halboffene Flächen | |
| Mönchsgrasmücke | <i>Sylvia atricapilla</i> | Anfang April* | Nestbau | Anfang April* | Mitte April | Mitte August | 07 nicht gefährdet | | < 2000 m | Grasmückenartige (Sylviidae) | Vielseitig | |
| Mornellregenpfeifer | <i>Eudromias morinellus</i> | Anfang Mai | kA | kein Nestbau | Mitte Mai | Mitte Juli | kA** | Anhang I | alpin | Regenpfeifer (Charadriidae) | Gebirge | Nestmulde, kein Nestbau |
| Nachtigall | <i>Luscinia megarhynchos</i> | Mitte April | Ankunft am Brutplatz | Mitte April | Anfang Mai | Mitte Juli | 02 Vom Verschwinden bedroht | | < 1000 m | Fliegenschnäpper (Muscicapidae) | Wald / Waldrand / halboffene Flächen | |
| Neuntöter | <i>Lanius collurio</i> | Anfang Mai | Ankunft am Brutplatz | Anfang Mai | Mitte Mai | Mitte August | 05 Nahezu gefährdet** | Anhang I | < 1600 m | Würger (Laniidae) | Offene Flächen | |
| Ortolan | <i>Emberiza hortulana</i> | Anfang Mai | Ankunft am Brutplatz | Anfang Mai* | Ende Mai | Ende Juli | 02 Vom Verschwinden bedroht** | Anhang I | < 700 m | Ammern (Emberizidae) | Offene Flächen | |
| Pirol | <i>Oriolus oriolus</i> | Anfang Mai | Ankunft am Brutplatz | Anfang Mai | Mitte Mai | Mitte Juli | 02 Vom Verschwinden bedroht | | < 1200 m | Pirole (Oriolidae) | Wald / Waldrand / halboffene Flächen | |
| Rabenkrähe (Aaskrähe) | <i>Corvus corone</i> | Anfang März | Nestbau | Anfang März | Mitte März | Mitte Juni | 07 nicht gefährdet | Anhang II | < 1600 m | Rabenvögel (Corvidae) | Vielseitig | Legebeginn frühestens Mitte, meist aber Ende März |
| Rauchschwalbe | <i>Hirundo rustica</i> | Anfang April* | Nestbau | Anfang April* | Mitte April | Mitte September | 05 Nahezu gefährdet** | | < 2000 m | Schwalben (Hirundinidae) | Siedlung / Kulturland | |
| Raufußkauz | <i>Aegolius funereus</i> | Anfang Februar | Revierbesetzung / Balzzeit | kein Nestbau | Mitte März | Mitte Juli | 08 Nicht genügend bekannt - Gefährdung möglich** | Anhang I | < 2000 m | Eigentliche Eulen (Strigidae) | Wald | Balzbeginn im Februar; Bruthöhle wird nicht gesäubert |

| Artname (Deutsch) | Artname (Latein) | Beginn Brutzeit | Definition Beginn Brutzeit | Nestbau | Eiablage | Flügge | Gefährdungskategorie | Vogelschutzrichtlinie | Höhenstufe | Taxonomie (Familie) | Habitat | Kommentar |
|---------------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------------------|---------------|--------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------------------|--|-------------------------|
| Reiherente | <i>Aythya fuligula</i> | Mitte April | Revierbesetzung | Anfang Mai* | Mitte Mai | Mitte August | 03 Stark gefährdet | Anhang II | < 1800 m | Entenvögel (Anatidae) | Gewässer | Ausgekleidete Nestmulde |
| Ringdrossel | <i>Turdus torquatus</i> | Ende März | Nestbau | Ende März | Mitte April | Mitte Juli | 07 nicht gefährdet** | | alpin | Drosseln (Turdidae) | Gebirge | |
| Ringeltaube | <i>Columba palumbus</i> | Ende Februar | Revierbesetzung | Anfang März* | Mitte März | Mitte September | 05 Nahezu gefährdet** | Anhang II | < 1600 m | Tauben (Columbidae) | Wald / Waldrand / halboffene Flächen | |
| Rohrhammer | <i>Emberiza schoeniclus</i> | Anfang April | Ankunft am Brutplatz | Anfang April* | Mitte April | Ende Juli | 03 Stark gefährdet | | < 1000 m | Ammern (Emberizidae) | Feuchtgebiete | Gewässer |
| Rotkehlchen | <i>Erithacus rubecula</i> | Mitte April | Nestbau / Eiablage | Mitte April | Mitte April | Mitte August | 07 nicht gefährdet | | < 2000 m | Fliegenschnäpper (Muscicapidae) | Vielseitig | |
| Rotmilan | <i>Milvus milvus</i> | Mitte März | Nestbau | Mitte März | Anfang April | Ende Juli | kA** | Anhang I | < 1200 m | Habichtartige (Accipitridae) | Kulturland / Waldrand / halboffene Flächen | |
| Rotsterniges Blaukehlchen | <i>Cyanecula svecica svecica</i> | Anfang Mai* | Nestbau | Anfang Mai* | Anfang Juni | Ende Juli | 02 Vom Verschwinden bedroht | Anhang I | 1650 - 2200 m | Fliegenschnäpper (Muscicapidae) | Gebirge | |
| Schilfrohrsänger | <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> | Mitte April | Revierbesetzung | Ende April | Anfang Mai | Ende Juli | 01 Verschwunden oder verschollen** | | < 1000 m | Rohrsängerartige (Acrocephalidae) | Gewässer | |
| Schneesperling | <i>Montifringilla nivalis</i> | Anfang Mai | Balz / Paarbildung | Anfang Mai | Mitte Mai | Mitte August | kA** | | alpin | Sperlinge (Passeridae) | Gebirge | |
| Schwanzmeise | <i>Aegithalos caudatus</i> | Anfang März | Ankunft am Brutplatz | Anfang März | Mitte März | Ende Juni | 05 Nahezu gefährdet** | | 1200 - 1450 m | Schwanzmeisen (Aegithalidae) | Wald / Waldrand / halboffene Flächen | |
| Schwarzkehlchen | <i>Saxicola torquatus</i> | Anfang März* | Nestbau | Anfang März* | Mitte März | Mitte August | 02 Vom Verschwinden bedroht ** | | < 1000 m | Fliegenschnäpper (Muscicapidae) | Offene Flächen | |

| Artnamen (Deutsch) | Artnamen (Latein) | Beginn Brutzeit | Definition Beginn Brutzeit | Nestbau | Eiablage | Flügge | Gefährdungskategorie | Vogelschutzrichtlinie | Höhenstufe | Taxonomie (Familie) | Habitat | Kommentar |
|--------------------|------------------------------|-----------------|----------------------------|---------------|--------------|--------------|--|-----------------------|------------|---------------------------------|--|---|
| Schwarzmilan | <i>Milvus migrans</i> | Mitte März | Nestbau | Mitte März | Anfang April | Mitte Juli | 01 Verschwunden oder verschollen** | Anhang I | < 1200 m | Habichtartige (Accipitridae) | Kulturland / Waldrand / halboffene Flächen | |
| Schwarzspecht | <i>Dryocopus martius</i> | Ende Februar | Revierbesetzung / Balzzeit | Anfang März | Anfang April | Mitte Juli | 07 nicht gefährdet | Anhang I | < 2000 m | Spechte (Picidae) | Wald | im März erreichen Reviermarkierung und Höhlenzeigen den Höhepunkt |
| Schwarzstorch | <i>Ciconia nigra</i> | Mitte März | Ankunft am Brutplatz | kA | Mitte April | kA | kA** | Anhang I | < 1400 m | Störche (Ciconiidae) | Wald | Habitat: an Gewässer/Feuchtigkeit gebunden; aktuell kein Horst bekannt, wobei in Nachbarregionen vielfach Felshorste bestehen |
| Singdrossel | <i>Turdus philomelos</i> | Anfang April* | Nestbau / Eiablage | Anfang April* | Anfang April | Mitte Juli | 07 nicht gefährdet | Anhang II | < 2000 m | Drosseln (Turdidae) | Wald | |
| Sommergoldhähnchen | <i>Regulus ignicapilla</i> | Mitte April | Nestbau | Mitte April | Ende April | Mitte Juli | 07 nicht gefährdet | | < 1800 m | Goldhähnchen (Regulidae) | Wald | |
| Sperber | <i>Accipiter nisus</i> | Anfang April | Balz | Anfang April | Anfang Mai | Mitte August | 06 Gefährdung anzunehmen** | | kA | Habichtartige (Accipitridae) | Kulturland / Waldrand / halboffene Flächen | Baubeginn frühestens Anfang März, gewöhnlich erst im April |
| Sperlingskauz | <i>Glaucidium passerinum</i> | Anfang März | Balz | kein Nestbau | Mitte April | Mitte Juli | 08 Nicht genügend bekannt - Gefährdung möglich** | Anhang I | < 2000 m | Eigentliche Eulen (Strigidae) | Wald | sexuelle Balz ab März, Bruthöhlen oder bestehende Nester |
| Star | <i>Sturnus vulgaris</i> | Ende März | Nestbau | Ende März | Anfang April | Mitte Juli | 07 nicht gefährdet** | Anhang II | < 1400 m | Stare (Sturnidae) | Vielseitig | |
| Steinadler | <i>Aquila chrysaetos</i> | Mitte Februar | Nestbau | Mitte Februar | Mitte März | Mitte August | 07 nicht gefährdet** | Anhang I | alpin | Habichtartige (Accipitridae) | Gebirge | |
| Steinhuhn | <i>Alectoris graeca</i> | Mitte April | Revierbesetzung / Balzzeit | Mitte Mai | Mitte Mai | Mitte August | 06 Gefährdung anzunehmen** | Anhang I; Anhang II | alpin | Fasanenartige (Phasianidae) | Gebirge | Balzbeginn ab Ende März; Nest - einfache Bodenmulde |
| Steinrötel | <i>Monticola saxatilis</i> | Mitte April | Ankunft am Brutplatz | Anfang Mai* | Mitte Mai | Ende Juli | 06 Gefährdung anzunehmen** | | alpin | Fliegenschnäpper (Muscicapidae) | Gebirge | |

| Artnamen (Deutsch) | Artnamen (Latein) | Beginn Brutzeit | Definition Beginn Brutzeit | Nestbau | Eiablage | Flügge | Gefährdungskategorie | Vogelschutzrichtlinie | Höhenstufe | Taxonomie (Familie) | Habitat | Kommentar |
|--------------------|--------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------|--------------|-----------------|--|-----------------------|---------------|-----------------------------------|--|--|
| Steinschmätzer | <i>Oenanthe oenanthe</i> | Mitte April | Ankunft am Brutplatz | Anfang Mai | Mitte Mai | Mitte August | 08 Nicht genügend bekannt - Gefährdung möglich** | | alpin | Fliegenschnäpper (Muscicapidae) | Gebirge | |
| Stieglitz | <i>Carduelis carduelis</i> | Anfang April | Revierbesetzung | Mitte April | Ende April | Mitte September | 07 nicht gefährdet** | | < 1400 m | Finken (Fringillidae) | Kulturland / Waldrand / halboffene Flächen | |
| Stockente | <i>Anas platyrhynchos</i> | Anfang März | Nestbau | Anfang März | Mitte März | Ende Juli | 05 Nahezu gefährdet** | Anhang II | < 1200 m | Entenvögel (Anatidae) | Gewässer | |
| Straßentaube | <i>Columba livia</i> | Ganzjährig | Ganzjährig | Ganzjährig | Ganzjährig | Ganzjährig | 07 nicht gefährdet | Anhang II | kA | Tauben (Columbidae) | Siedlung / Kulturland | |
| Sumpfmeise | <i>Poecile palustris</i> | Mitte März | Balz / Paarbildung | Ende März | Anfang April | Ende Juni | 07 nicht gefährdet | | < 1400 m | Meisen (Paridae) | Wald / Waldrand / halboffene Flächen | bevorzugt in Auwäldern |
| Sumpfrohrsänger | <i>Acrocephalus palustris</i> | Anfang Mai | Ankunft am Brutplatz | Mitte Mai* | Anfang Juni | Ende Juli | 04 Gefährdet | | < 1000 m | Rohrsängerartige (Acrocephalidae) | Kulturland / Waldrand / halboffene Flächen | oft entlang von Gewässern und in Auwäldern |
| Tafelente | <i>Aythya ferina</i> | Anfang April | Revierbesetzung | Anfang Mai | Anfang Mai | Ende Juli | kA** | Anhang II | < 700 m | Entenvögel (Anatidae) | Gewässer | |
| Tannenhäher | <i>Nucifraga caryocatactes</i> | Mitte März | Nestbau / Eiablage | Mitte März | Mitte März | Ende Juli | 07 nicht gefährdet | | 1100 - 2200 m | Rabenvögel (Corvidae) | Wald | |
| Tannenmeise | <i>Periparus ater</i> | Mitte März | Balz / Paarbildung | Ende März* | Anfang April | Mitte August | 07 nicht gefährdet | | < 2200 m | Meisen (Paridae) | Wald | |
| Teichhuhn | <i>Gallinula chloropus</i> | Ende März | Nestbau | Ende März | Mitte April | Mitte August | 03 Stark gefährdet** | Anhang II | < 1000 m | Rallen (Rallidae) | Gewässer | |
| Teichrohrsänger | <i>Acrocephalus scirpaceus</i> | Ende April | Ankunft am Brutplatz | Anfang Mai | Mitte Mai | Ende August | 02 Vom Verschwinden bedroht | | < 1000 m | Rohrsängerartige (Acrocephalidae) | Gewässer | |

| Artnamen (Deutsch) | Artnamen (Latein) | Beginn Brutzeit | Definition Beginn Brutzeit | Nestbau | Eiablage | Flügge | Gefährdungskategorie | Vogelschutzrichtlinie | Höhenstufe | Taxonomie (Familie) | Habitat | Kommentar |
|--------------------|--------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|----------------|--------------|------------------------------------|-----------------------|------------|-----------------------------------|--|---|
| Trauerschnäpper | <i>Ficedula hypoleuca</i> | Anfang Mai | Ankunft am Brutplatz | Anfang Mai | Anfang Mai | Mitte Juli | 06 Gefährdung anzunehmen** | | < 1400 m | Fliegenschnäpper (Muscicapidae) | Wald / Waldrand / halboffene Flächen | |
| Türkentaube | <i>Streptopelia decaocto</i> | Anfang Februar | Nestbau | Anfang Februar | Anfang Februar | Ende Oktober | 04 Gefährdet** | Anhang II | < 1400 m | Tauben (Columbidae) | Vielseitig | |
| Turmfalke | <i>Falco tinnunculus</i> | Mitte März | Revierbesetzung / Balzzeit | kein Nestbau | Mitte April | Ende August | 05 Nahezu gefährdet | | kA | Falkenartige (Falconidae) | Vielseitig | Nutzt bereits bestehende Nester; Höhlen; Felsen oder Gebäude |
| Turteltaube | <i>Streptopelia turtur</i> | Ende April | Revierbesetzung | Anfang Mai* | Mitte Mai | Mitte Juli | 01 Verschwunden oder verschollen** | Anhang II | < 1000 m | Tauben (Columbidae) | Kulturland / Waldrand / halboffene Flächen | |
| Uhu | <i>Bubo bubo</i> | Mitte Januar | Revierbesetzung / Balzzeit | kein Nestbau | Mitte März | Mitte Juli | 05 Nahezu gefährdet** | Anhang I | < 2200 m | Eigentliche Eulen (Strigidae) | Fels | Legebeginn frühestens ab Ende Januar, Hauptzeit im März, Brüten in Felsen |
| Wacholderdrossel | <i>Turdus pilaris</i> | Anfang April* | Nestbau / Eiablage | Anfang April* | Anfang April | Mitte Juli | 07 nicht gefährdet | Anhang II | < 2000 m | Drosseln (Turdidae) | Kulturland / Waldrand / halboffene Flächen | |
| Wachtel | <i>Coturnix coturnix</i> | Anfang Mai | Ankunft am Brutplatz | Anfang Mai* | Mitte Mai | Mitte August | 02 Vom Verschwinden bedroht | Anhang II | < 2000 m | Fasanenartige (Phasianidae) | Offene Flächen | |
| Wachtelkönig | <i>Crex crex</i> | Anfang Mai* | Nestbau | Anfang Mai* | Mitte Mai | Mitte August | 02 Vom Verschwinden bedroht | Anhang I | kA | Rallen (Rallidae) | Offene Flächen | |
| Waldbaumläufer | <i>Certhia familiaris</i> | Mitte März | Balz | Ende März | Mitte April | Mitte Juli | 07 nicht gefährdet | | < 1800 m | Baumläufer (Certhiidae) | Wald | |
| Waldkauz | <i>Strix aluco</i> | Anfang Februar | Eiablage | kein Nestbau | Anfang Februar | Ende Juni | 04 Gefährdet** | | < 2000 m | Eigentliche Eulen (Strigidae) | Wald / Waldrand / halboffene Flächen | Habitat: Kulturland, Waldrand, lichte Wälder oder auch Städte möglich; Hauptlegezeit im März, in tieferen Lagen nicht selten schon im Februar; Höhlenbrüter |
| Waldbaumläufer | <i>Phylloscopus sibilatrix</i> | Ende April | Ankunft am Brutplatz | Ende April | Anfang Mai | Mitte Juli | 07 nicht gefährdet** | | < 1600 m | Laubsängerartige (Phylloscopidae) | Wald | in den Alpen bei über 700 m Legebeginn ab Mitte Mai |

| Artnamen (Deutsch) | Artnamen (Latein) | Beginn Brutzeit | Definition Beginn Brutzeit | Nestbau | Eiablage | Flügge | Gefährdungskategorie | Vogelschutzrichtlinie | Höhenstufe | Taxonomie (Familie) | Habitat | Kommentar |
|--------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|---------------|--------------|-----------------------------|-----------------------|------------|-----------------------------------|--|--|
| Waldohreule | <i>Asio otus</i> | Anfang März | Eiablage | kein Nestbau | Anfang März | Mitte Juli | 03 Stark gefährdet | | < 2000 m | Eigentliche Eulen (Strigidae) | Wald / Waldrand / halboffene Flächen | Nutzt bereits bestehende Nester |
| Waldschnepfe | <i>Scolopax rusticola</i> | Mitte März* | Nestbau / Eiablage | Mitte März* | Mitte März | Mitte August | 06 Gefährdung anzunehmen** | Anhang II | < 2000 m | Schnepfenvögel (Scolopacidae) | Wald | Nestmulde, wird ausgekleidet |
| Wanderfalke | <i>Falco peregrinus</i> | Mitte Februar | Eiablage | kein Nestbau | Mitte Februar | Mitte Juli | 03 Stark gefährdet | Anhang I | kA | Falkenartige (Falconidae) | Fels | kein Nestbau, nur Muldenscharren |
| Wasseramsel | <i>Cinclus cinclus</i> | Anfang Februar | Nestbau | Anfang Februar | Mitte Februar | Mitte Juli | 07 nicht gefährdet | | < 2200 m | Wasseramseln (Cinclidae) | Gewässer | frühester Nestbau bereits im Januar möglich, in höheren Lagen ab ca. Anfang März |
| Wasserralle | <i>Rallus aquaticus</i> | Ende März | Revierbesetzung | Anfang April* | Mitte April | Ende Juli | 02 Vom Verschwinden bedroht | Anhang II | < 1400 m | Rallen (Rallidae) | Gewässer | |
| Weidenmeise | <i>Poecile montanus</i> | Ende März* | Nestbau | Ende März* | Mitte April | Mitte August | 07 nicht gefährdet | | < 1800 m | Meisen (Paridae) | Wald | |
| Weißrückenspecht | <i>Dendrocopos leucotos</i> | Ende Februar | Revierbesetzung / Balzzeit | Mitte März* | Mitte April | Ende Juni | 06 Gefährdung anzunehmen** | Anhang I | < 1800 m | Spechte (Picidae) | Wald | |
| Wendehals | <i>Jynx torquilla</i> | Mitte April | Balz | Mitte April* | Anfang Mai | Mitte August | 04 Gefährdet | | < 1800 m | Spechte (Picidae) | Kulturland / Waldrand / halboffene Flächen | vor allem Baumhöhlen, mehrere Tage Säuberung |
| Wespenbussard | <i>Pernis apivorus</i> | Mitte April | Ankunft am Brutplatz | Mitte April | Mitte Mai | Ende August | 03 Stark gefährdet | Anhang I | < 1600 m | Habichtartige (Accipitridae) | Kulturland / Waldrand / halboffene Flächen | |
| Wiedehopf | <i>Upupa epops</i> | Anfang April | Ankunft am Brutplatz | kein Nestbau | Mitte April | Ende Juli | 02 Vom Verschwinden bedroht | | kA | Wiedehopfe (Upupidae) | Kulturland / Waldrand / halboffene Flächen | Bruthöhlen aller Art, werden gesäubert durch das Brutpaar |
| Wiesenpieper | <i>Anthus pratensis</i> | Ende März* | Nestbau | Ende März* | Anfang April | Ende Juli | 02 Vom Verschwinden bedroht | | < 2000 m | Stelzen und Pieper (Motacillidae) | Offene Flächen | |

| Artnamen (Deutsch) | Artnamen (Latein) | Beginn Brutzeit | Definition Beginn Brutzeit | Nestbau | Eiablage | Flügge | Gefährdungskategorie | Vogelschutzrichtlinie | Höhenstufe | Taxonomie (Familie) | Habitat | Kommentar |
|--------------------|--------------------------------|-----------------|----------------------------|---------------|--------------|------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---|
| Wintergoldhähnchen | <i>Regulus regulus</i> | Ende März | Nestbau | Ende März | Anfang April | Mitte August | 07 nicht gefährdet | | < 2200 m | Goldhähnchen (Regulidae) | Wald | |
| Zaunkönig | <i>Troglodytes troglodytes</i> | Anfang April | Nestbau | Anfang April | Mitte April | Mitte August | 07 nicht gefährdet | | < 2200 m | Zaunkönige (Troglodytidae) | Wald / Waldrand / halboffene Flächen | |
| Ziegenmelker | <i>Caprimulgus europaeus</i> | Anfang Mai | Revierbesetzung | kein Nestbau | Mitte Mai | Ende Juli | 06 Gefährdung anzunehmen** | Anhang I | < 1800 m | Nachtschwalben (Caprimulgidae) | Wald | |
| Zilpzalp | <i>Phylloscopus collybita</i> | Anfang April | Ankunft am Brutplatz | Anfang April | Mitte April | Mitte August | 07 nicht gefährdet | | < 2000 m | Laubsängerartige (Phylloscopidae) | Wald | |
| Zippammer | <i>Emberiza cia</i> | Anfang April | Balz / Paarbildung | Mitte April | Anfang Mai | Anfang September | 06 Gefährdung anzunehmen** | | < 1600 m | Ammern (Emberizidae) | Wald / Waldrand / halboffene Flächen | Habitat: Gebirge, Geröll, vereinzelt bis an den Talboden reichend |
| Zitronenzeisig | <i>Carduelis citrinella</i> | Anfang März | Nestbau / Eiablage | Anfang März | Anfang März | Mitte August | 07 nicht gefährdet** | | 1100 - 2200 m | Finken (Fringillidae) | Wald / Waldrand / halboffene Flächen | |
| Zwergschnäpper | <i>Ficedula parva</i> | Anfang Mai | Ankunft am Brutplatz | Anfang Mai | Mitte Mai | Ende Juli | 06 Gefährdung anzunehmen** | Anhang I | < 1000 m | Fliegenschnäpper (Muscicapidae) | Wald | |
| Zwergtaucher | <i>Tachybaptus ruficollis</i> | Anfang April* | Nestbau | Anfang April* | Mitte April | Mitte August | 02 Vom Verschwinden bedroht | | < 1800 m | Lappentaucher (Podicipedidae) | Gewässer | |

| Spalte | Quelle |
|----------------------|--|
| Eiablage, Flüge | Website Schweizerische Vogelwarte (05.03.2019) |
| Gefährdungskategorie | Die Brutvögel Tirols (2001) |
| Höhenstufen, Habitat | Das Kompendium der Vögel Mitteleuropas (2012) |
| Nestbau | Handbuch der Vögel Mitteleuropas |
| Beginn Brutzeit | Glutz von Blotzheim und Bauer (2001): Handbuch der Vögel Mitteleuropas sowie homepage Birdlife Austria Brutvogelatlas neu: Methodische Anpassungen und Klarstellungen für das Kartierungsjahr 2014 |