Phytoplankton-Biomassen in Tiroler Badeseen im Jahr 2017

Oberflächenproben

jeweils dargestellt: Minimum, Maximum und Mittelwert (bzw. Einzelwert) des Beobachtungszeitraumes
(Seen alphabetisch geordnet)



2017	Badesee Going	Badesee Kirchberg	Badesee Mieming	Badesee Weißlahn	Baggersee Rossau	Bergisteiner See	Brixener Badeteich	Haldensee	Hechtsee	Hintersteiner See	Krummsee	Lanser See	Lauchsee Fieberbrunn	Moorstrandbad Kirchbichl	Natterer See	Reintaler See	Reither See	Rieder Badesee	Schwarzsee / Kitzbühel	Stimmersee	Thiersee	Tristacher See	Überwasser Ladis	Urisee	Vilsalpsee	Walchsee	Wildsee / Seefeld
Min	0,2	0,1	0,3	3,1	1,2	1,1	0,2	0,2	0,2	0,0	0,7	1,7	1,7	1,8	0,2	1,0	1,0	1,9	1,0	0,2	0,1	0,8	0,3	0,1	0,1	0,3	0,5
Max	0,8	0,6	1,4	5,3	2,6	2,3	2,1	0,2	1,4	0,2	2,0	2,4	3,5	3,4	4,0	2,1	11,1	7,8	2,4	0,4	1,2	2,3	1,4	0,2	0,4	0,9	1,6
MW	0,6	0,3	0,9	3,9	2,0	1,5	0,9	0,2	0,6	0,1	1,4	2,0	2,5	2,5	2,4	1,7	4,9	4,2	1,6	0,3	0,6	1,6	0,7	0,2	0,2	0,5	0,9
Anzahl der Werte	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

Sichttiefen-Verhältnisse in Tiroler Badeseen im Jahr 2017

jeweils dargestellt: Minimum, Maximum und Mittelwert (bzw. Einzelwert) des Beobachtungszeitraumes
(Seen alphabetisch geordnet)



2017	Badesee Going	Badesee Kirchberg	Badesee Mieming	Badesee Weißlahn	Baggersee Rossau	Bergisteiner See	Brixener Badeteich	Haldensee	Hechtsee	Hintersteiner See	Krummsee	Lanser See	Lauchsee Fieberbrunn	Moorstrandbad Kirchbichl	Natterer See	Reintaler See	Reither See	Rieder Badesee	Schwarzsee / Kitzbühel	Stimmersee	Thiersee	Tristacher See	Überwasser Ladis	Urisee	Vilsalpsee	Walchsee	Wildsee / Seefeld
Min	1,4			0,6	1,0			3,3	1,1	11,3		1,7	1,0	0,9	1,0	2,2	2,0	1,2	1,5	3,9	1,9	1,4		7,9	6,4	4,2	0,6
Max	2,4			1,0	3,7			7,2	9,1	12,9		1,8	2,5	1,9	1,1	5,5	2,4	2,7	2,4	3,9	5,4	2,9		11,9	9,9	5,5	3,3
MW	1,9	3,2		0,9	2,2	1,8	2,5	5,0	4,3	11,9		1,7	1,5	1,6	1,1	3,4	2,3	2,0	2,0	3,9	3,2	2,2		9,9	8,2	4,7	1,9
Anzahl der Werte	2	1	0	3	3	1	1	3	3	3	0	3	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	0	3	3	3	3

Gesamt-Phosphor-Konzentrationen in Tiroler Badeseen 2017

Oberflächenproben

Jeweils dargestellt: Minimum, Maximum und Mittelwert (bzw. Einzelwert) des Beobachtungszeitraumes

kursiv: Ist der Gehalt an Gesamt-Phosphor (TP) geringer als 3µg (<3), wird für die Berechnung des Mittelwertes die Hälfte des Wertes verwendet. Ist er unter der Nachweisbarkeitsgrenze von 0,8 µg/l (n.n.), wird dieser Wert verwendet (siehe Tab.2)
(Seen alphabetisch geordnet)



2017	Badesee Going	Badesee Kirchberg	Badesee Mieming	Badesee Weißlahn	Baggersee Rossau	Bergisteiner See	Brixener Badeteich	Haldensee	Hechtsee	Hintersteiner See	Krummsee	Lanser See	Lauchsee Fieberbrunn	Moorstrandbad Kirchbichl	Natterer See	Reintaler See	Reither See	Rieder Badesee	Schwarzsee / Kitzbühel	Stimmersee	Thiersee	Tristacher See	Überwasser Ladis	Urisee	Vilsalpsee	Walchsee	Wildsee / Seefeld
Min	4	*1,5*	7	10	7	6	*1,5*	*1,5*	*0,8*	*0,8*	8	8	9	12	17	7	8	8	12	4	3	6	*1,5*	*0,8*	*1,5*	4	5
Max	9	9	12	18	13	7	7	*1,5*	10	*1,5*	12	11	29	13	43	9	25	10	19	4	10	17	32	*1,5*	*1,5*	7	23
MW	7	6	9	15	11	7	4	2	5	1	11	9	21	13	28	8	16	9	15	4	6	10	15	1	2	5	12
Anzahl der Werte	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3