


Phytoplankton-Biomassen [g/m³] in Tiroler Bädeseen in den Jahren 1992 bis 2022

Werte der Oberflächenproben bzw. der Mischproben (2007: Achensee, Heiterwanger See, Plansee)


Mittelwert der Jahresmittelwerte (MW) mit Angabe der jeweiligen Minimumswerte (Min) und Maximumswerte (Max) bzw. Einzelwerte
 (Ergebnisse und Anzahl der Untersuchungen siehe untenstehende Tabelle)

(Seen alphabetisch geordnet)



Sichttiefen [m] in Tiroler Badeseen in den Jahren 1992 bis 2022


**Minima, Maxima und Mittelwerte der Jahresmittelwerte bzw. Einzelwerte
(Ergebnisse und Anzahl der Untersuchungen siehe untenstehende Tabelle)**
(Seien alphabetisch geordnet)



Gesamt-Phosphor-Konzentrationen [µg/l] in Tiroler Badeseen in den Jahren 2003 bis 2022 (Oberflächenwerte)

Minima, Maxima und Mittelwerte der Jahresmittelwerte bzw. Einzelwerte
(Ergebnisse und Anzahl der Untersuchungen siehe untenstehende Tabelle)
 (Sehen alphabetisch geordnet)

Sind die Gesamt-Phosphor-Konzentrationen geringer als die Bestimmungsgrenze (=3µg/l), wird für die Berechnung des Mittelwertes der halbe Wert der Bestimmungsgrenze (1.5µg/l) verwendet. Liegt die Konzentration unter der Nachweisbarkeitsgrenze von 0.8µg/l, wird dieser Wert verwendet



2003-2022

Minimum der Jahresmittel	2	5	6		9	13	7	6		2			2	5	2	1	7	9	10		7	20	3	2	8	10	9		12		4	4	14	12	7	7	1	1		4	7
Maximum d. Jahresmittel	12	20	29		27	26	23	15		50			13	13	7	10	23	23	35		36	75	10	16	17	39	20		26		15	12	31	14	37	10	15		15	27	
Mittelwert d. Jahresmittel	5	10	11		16	18	12	10		11			5	8	4	3	12	16	20		18	32	6	6	11	19	13		19		8	7	21	10	16	4	4		8	12	
Anzahl der Werte	7	43	43		48	51	58	43		41			46	46	8	45	46	50	46		48	46	4	8	73	51	47		46		38	47	8	49	47	44	45		45	47	